

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Наказ Міністерства охорони
здоров'я України**

19.07.2016 № 730

Реєстраційне посвідчення
№ UA / 15305 / 01 / 02

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %
(ALCOHOL ETHYL 96 %)

Склад:

діюча речовина: етанол;
не менше 95,1 % об./об. (92,6 % м/м) і не більше 96,9 % об./об. (95,2 % м/м)
етанолу, а також воду.

Лікарська форма. Розчин для зовнішнього застосування.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора, безбарвна, летка,
легкозаймиста рідина. Гігроскопічна.

Фармакотерапевтична група.

Антисептичні та дезінфекційні засоби. Код АТХ D08A X08.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну,
дезінфікуючу, місцевоподразнювальну дію. Етанол коагулює білки,
активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів.
Чинить "дубильну" дію на шкіру та слизові оболонки.

Фармакокінетика.

При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.

Клінічні характеристики.

Показання.

Дезінфекція шкіри рук.

Противоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість. Не можна застосовувати при гострих
запальних процесах шкіри. Дитячий вік до 14 років.

Особливі заходи безпеки.

У разі почервоніння і подразнення шкіри необхідно припинити застосування
препарату і змити рідину водою.

Не допускати потрапляння препарату в очі.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При зовнішньому застосуванні етанолу результати взаємодії з іншими
лікарськими засобами не відомі.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності і годування груддю застосування препарату
лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик
для плода або дитини.

Директор



Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Зовнішньо - наносять на шкіру за допомогою ватних тампонів, серветок.

Діти.

Не застосовувати дітям віком до 14 років.

Передозування.

При зовнішньому застосуванні випадки передозування не відомі.

Побічні реакції.

При місцевому застосуванні - подразнення шкіри або слизових оболонок.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці, подалі від вогню.

Упаковка. По 100 мл у флакони.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник.

Державне підприємство спиртової та лікєро-горілкової промисловості «Укрспирт».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 41655, Сумська обл., Конотопський район, смт. Дубов'язівка, вул. Петра Лустя, 38.

Дата останнього перегляду.

Директор
"ФАРМА МЕД"
СУМИ
І.К. 40564781
Україна, м. Суми